

Med dnom in spodnjim robom te deščice je odprtina čez vso širino panja; imenujemo jo ameriško žrelo, ker ga je že proti koncu prejšnjega stoletja priredil A. J. Root za Langstrothov panj, pri nas pa prilagodil leta 1918 A. Bukovec za AŽ-panj. V to žrelo vtaknemo posebno zagozdo (18), v katero je vrezano manjše žrelo, 200 mm dolgo in 8 mm visoko.* Zagozda je na notranji strani tako visoka, kakor je odprtina ameriškega žrela (26 mm), vendar naj ne bo pretesno vstavljena, da jo

* Manjša žrela zavirajo poleti zračenje panja, to pa pospešuje rojenje.

Januar je eden izmed tistih mesecev, ki se tem bolj ugodno izteče za čebele, čim manj se čebelar mota okrog njih, čim manj jih obiskuje in nadleguje. Docela zadostuje, če stopi vsak teden enkrat pred čebelnjak in si ogleda panje spredaj pri žrelih. Sumljivo bi bilo, če bi bila žrela zamašena z mrtvicami ali če bi našel na bradi kakega panja sledove zdobljenih voščin. To je znamenje, da je v panju gospodarila miš ali rovka. Proti takim vsiljencem se zavaruješ z luknjičavimi zapahi, ki pa si jih moral pritrditi ob žrelih že jeseni. Žolne, sinice in druge ptice odvrneš od stikanja okrog panjev s tem, da obesiš na drevesa v primerni oddaljenosti od čebelnjaka kako na pol obrano kost ali lončke, zalite s salom, v katerega si zamešal žitna zrna in podobno pičo. Če se hočeš prepričati, ali družinam v resnici ničesar ne manjka, prisloni na vratca panja uho in prislušuj šumenju čebel! Ob močnejšem šumenju, ki si ga prvokrat zasledil pri kaki družini, se ti še ni treba razburjati. Le če šumenje ne pojenja niti drugi niti naslednji dan, je možno, da ji primanjkuje vode, morda tudi hrane, ali da je prišla ob matico. Taka ugotovitev pa navadno kaj malo pomaga. Saj zahteva temeljit poseg v notranjost panja, ki pa more v zimskem času več škodovati, kot koristiti.